Mode d'emploi du médicament CICATRYL

Dans quel cas le médicament CICATRYL est-il prescrit ?

Cette pommade associe des substances antiseptiques et cicatrisantes.
Elle est utilisée dans le traitement des brûlures et des plaies superficielles peu étendues.

Présentations du médicament CICATRYL

CICATRYL : pommade ; boîte de 14 sachets de 2 g

Composition du médicament CICATRYL

	p 100 g
Allantoïne	1 g
Parachlorométacrésol	120 mg
Gaïazulène	7 mg
Alpha-tocophérol acétate (vitamine E)	10 mg
Parahydroxybenzoate de méthyle	+
Parahydroxybenzoate de propyle	+

Substances actives : Allantoïne, Alpha-tocophérol acétate, Chlorocrésol, Gaïazulène
Excipients : Acide gras éthoxylé, Alcool cétostéarylique, Glycérol monostéarate, Macrogol 400, Paraffine liquide légère, P-hydroxybenzoate de méthyle, P-hydroxybenzoate de propyle, Sodium cétostéaryl sulfate, Sorbitol solution, Vaseline

Fertilité, grossesse et allaitement

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. Ne l'utilisez pas de façon prolongée sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

Mode d'emploi et posologie du médicament CICATRYL

Nettoyer la région à traiter avant l'application d'une couche mince. Masser légèrement pour faire pénétrer la pommade.
Posologie usuelle :
1 ou 2 applications par jour.

Effets indésirables possibles du médicament CICATRYL

Eczéma de contact (présence de parahydroxybenzoates).
Exceptionnellement : réaction allergique.

Merci de nous contacter pour toute demande ou interrogation.

Pharmacie Paget
2 rue Pasteur
81990 Puygouzon

Tél 05.63.54.11.02
Fax 05.63.38.96.10
pharmacie.paget@yahoo.fr

Votre santé, notre priorité

Si vos symptômes persistent, contactez votre médecin.